

**PLANTES NOUVELLES, RARES OU CRITIQUES  
DES SERRES DU MUSÉUM**  
(NOTULES SUR QUELQUES ORCHIDÉES D'INDOCHINE. XXIII)

Par A. GUILLAUMIN.

**383. *Luisia acutilabris* Guillaum. sp. nov.**

*Caudex 6 cm alta, 4 mm crassa, internodiis circa 1 cm longis, foliis teretibus, 8-12 cm longis, 4 mm crassis, rectis, levissime arcuatis, apice leviter asymmetricè obtusis. Inflorescentia racemosa, 4 cm longa, gracilis, 3<sup>a</sup> suprema parte florifera, vaginibus 2, scariosis, tubulosis, 2 mm altis, bracteis scariosis, ovatis, apice rotundatis, 1 mm longis, floribus 3, 1 cm latis, pedicello ovarioque 7 mm longis, sepalis petalisque leviter luteo brunneis, nervis roseis, sepalis apice rotundatis, superiore ovato (6 mm × 3 mm), 5-nervio, lateralibus lineari ovatis, levissime obliquis, aequilongis, 3-nerviis, petalis aequilongis, similibus, 5-nerviis, labello albo, 1 cm longo (calcare incluso), lobis lateralibus erectis, rhombeis, apice violaceo cornutis, medio leviter violaceo, triangulari, acuminato, 5 mm longo, basi triangulariter calloso, calcare horizontali, sacciformi, 3 mm longo, albo-roseo, 7-nervio, apice medio leviter sulcato, columna 4 mm longa, basi incrassata, alba, villosa, apice atro rubra, antherae terminalis operculo quadrato, polliniis globosis.*

Laos : Vientiane (TIXIER *Luisia* n<sup>o</sup> 6, f. 192, 1955).

Bien distinct par son labelle à lobe médian triangulaire acuminé des quelques espèces à labelle pourvu d'un éperon suceiforme.

**384. *Calanthe Eberhardtii* Gagnep. — Annam : Manline, forêt dense (TIXIER n<sup>o</sup> 8/59, f. 258, 1959).**

Pseudobulbes coniques (3 cm de diam.); floraison avant les feuilles; fleurs 10, à sépales et pétales brun verdâtre clair, labelle à lobes latéraux blancs lavés de rose au milieu, le médian blanc irrégulièrement ponctué de rose, éperon brun verdâtre clair, colonne blanche marbrée de rose, opercule de l'anthere à lobes arrondis finement granuleux, pourpre foncé.

N'avait encore été signalé qu'au Tonkin.

***Cephalantheropsis* Guillaum. gen. nov.**

*Ebulbosa, foliis annuis, plicatis; inflorescentiae e caule laterales, racemosae, sepalis conniventibus sed liberis, lanceolatis, petalis ovatis, labello incluso, columnae basi inserto, basi gibboso, supra valde concavo, lobis 3, lateralibus columnam amplexantibus, medio 2-lobulato, laminibus e labelli basi ad lobi medii basin, columna brevissima, erecta, antice complanata, rostello apice capitato, anthera incumbente, operculo hemisphaerico, polliniis 4, 6, 8, 2-3-4-nis, oblongis inappendiculatis, stigmatè terminali.*

Présente l'organisation florale des *Cephalanthera* sauf que la colonne n'est pas allongée et qu'il y a 4, 6, 8 pollinies réunies en 2 groupes au lieu de 2 pollinies bipartites ; en diffère surtout par les inflorescences plusieurs latérales et non unique et terminale.

385. **C. lateriscapa** Guillaum. sp. nov.

*Ebulbosa, caulibus pluribus, simplicibus, erectis, usque ad 30 cm altis, cylindricis (4 mm diam.), basi leviter globose incrassatis, vaginibus 4 cm longis, basi stramineis, ad apicem viridibus obtectis, foliis circa 5, annuis membranaceis, alternis, lanceolatis (15 cm × 3-4 cm), longitudinaliter plicatis, laete viridibus denique nigrescentibus. Inflorescentiae plures, racemosae, erectae, 15 cm longae, e caulis parte inferiore defoliata lateraliter orientes, scapo vaginibus 3-5, viridibus, lanceolatis, 2 cm longis vestito, brevissime velutino, bracteis cito caducis, anguste lanceolatis, 2 cm longis, albidis, pedicello 5 mm. longo, brevissime velutino, albo, ovario leviter brevior, brevissime velutino, viridi, perianthio albo, deinde luteolo denique nigrescente, sepalis conniventibus sed liberis, ovato-lanceolatis, acutis, 6 mm longis, 3-nerviis, extra leviter breviterque pilosis, petalis ovatis, obtusis, aequilongis, glabris, 1-nerviis, labello incluso, columnae basi inserto, sepalis aequilongo, basi gibboso et supra valde concavo, lobis lateralibus erectis, columnam amplectentibus, apice erosis, medio lateralibus 2-plo brevior, 2-lobulato, lobulis discoideis, margine erosis crispatique, laminibus 2, e labelli basi incrassatis et ad lobi meddii basin verrucis 2, aurantiacis desinentibus, disci labelli parte inter laminae breviter pilosa, columna brevissima (3 mm), erecta, antice complanata sparsissime molliter pilosa, rostello apice capitato, antherae incumbentis operculo hemispherico, pollinis 4, 6, 8, 2-3-4 nis, oblongis, inappendiculatis, stigmatate terminali.*

Annam : région de Dalat : Manline, bord d'un ruisseau, forêt dense. (TIXIER n° 12/59, f. 258, 1959).

269 *Bulbophyllum Jacquetii* Gagnep. var. **rosea** Guillaum. var. nov.

*Scapo abunde nigro purpureo marmorato ; sepalis colore lutea lineis numerosis roseo purpuratis fere obtecta.*

Annam : Dalat (TIXIER f. 248, 1957).

386. *Phalaenopsis Mannii* Reichb. f. — Annam : Dalat (TIXIER n° 19/59, f. 352, 1959).

N'avait encore été trouvée qu'une fois en Indochine, spécialement en Annam.

PLANTE AUTRE QUE DES ORCHIDÉES.

387. *Salicornia brachiata* Roxb. — Annam : ancien marais salants de la région de Cam Ranh, à 200 m de la mer, sable argileux inondé périodiquement par la marée. Petite plante rampante à tige ligneuse et articles vert et carmin (DE SIGALDI n° 235/ Sig. leg. NGUYEN LONG HUÂN).

Pour les indigènes, cette plante est l'indice de la présence du sel rendant les autres cultures impossibles.

Aucune Salicorne n'avait été signalée ni dans la Péninsule malaise, ni en Indochine.